Lacanau-Océan
Étang de Lacanau
Le Porge
Lège-Cap-Ferret
Arcachon
Lac de Cazaux et de Sanguinet
Lac de Biscarrosse et de Parentis
Mimizan
Contis-les-Bains
Moliets-et-Maa
Vieux-Boucau-les-Bains
Capbreton
Dax
Bayonne
Biarritz
Frontière Franco-Espagnole
N
W
E
S
Système cartographique Lambert 93 - RGF93
Graticules WGS84
Profondeurs en mètres rapportées au zéro des cartes marines
0
10
20
30 km
0
5
10
15 M
CREOCEAN - 160028 - 2017-11-21T16:09:16
45°00'N
44°50'N
44°40'N
44°30'N
44°20'N
44°10'N
44°00'N
43°50'N
43°40'N
2°00'O
1°50'O
1°40'O
1°30'O
1°20'O
1°10'O
1°00'O


Forêt Domaniale de Lacanau
Lacanau-Océan
Étang de Lacanau
LAC DE LACANAU
Le Porge
Forêt Communale du Porge
LÈGE-CAP-FERRET
Forêt Domaniale de Lège et Garonne
Dunes Boisées
ARÈS
ANDERNOS-LES-BAINS
BASSIN D'ARCACHON
ARCACHON
N
W
E
S
0
1
2
3 km
IGN - SCAN100, 2016. Contrat RTE ESRI FRANCE CX524C6008

Légende

▭ Aire d'étude

Limites administratives

-·-·- 12milles

······ 9milles

-··-·· 6milles

---- 3milles

▨ roche

— Isocontours bathymétriques (SHOM-Homonim, 2017)

▭ ZPS

▭ SIC

▭ Projet d'extension Natura 2000 au large

▭ RNN du Banc d'Arguin

▭ PNM Bassin d'Arcachon

▭ Zone de fréquentation principale des mammifères marins

Carte des peuplements benthiques (EUNIS) en Atlantique

- A2 - Sediment littoral
- A5.12_FR01 - Gravier propre infralittoral à [Dosinia exoleta]
- A5.12_FR02 - Sable grossier infralittoral à [Donax politus] et [Callista chione]
- A5.135 - Sédiment grossier sablo-graveleux à [Clausinella fasciata] et [Branchiostoma lanceolatum]
- A5.231 - Sable fin à moyen mobile infralittoral à faune éparse à [Abra prismatica et opheliidae]
- A5.24_FR01 - Sable envase infralittoral à [Amphiura brachiata] et [Euclymene oerstedii]
- A5.242 - Sable fin envasé compact de l'infralittoral à [Fabulina fabula], [Magelona mirabilis], bivalves vénéridés et amphipodes
- A5.245 - Sable envasé infralittoral à [Turitella]
- A5.25_FR01 - Sable fin circalittoral à [Chamelea striatula] et [Dosinia lupina]
- A5.251 - Sable fin mobile circalittoral à [Echinocyamus pusillus], [Ophelia borealis] et [Abra prismatica]
- A5.251 x A5.231 - Sable fin à moyen mobile infralittoral ou circalittoral à faune éparse à [Abra prismatica], [Bathyporeia elegans] et polychètes et opheliidae
- A5.26_FR01 - Sable fin envasé circalittoral côtier à [Amphiura filiformis] et [Tellina serrata]
- A5.261 x A5.262 - Hétérogène ou sable envasé circalittoral à [Abra alba] et [Nucula nitidosa] ou [Amphiura brachiata] avec [Astropecten irregularis] et autres échinodermes
- A5.35_FR01 - Vase sableuse à [Maldane glebifex] et [Clymene modesta]
- A5.361 - Vase circalittorale à pennatules et megafaune fouisseuse
- A5.363 - Vase circalittorale à [Brissopsis lyrifera] et [Amphiura chiajei]

Indice de richesse benthique

- Faible
- Moyen
- Fort

▨ Zone de nourricerie pour la Sole, le Céteau, l'Ombrine bronze d'après Guérault et al, 1996.

Distribution des zones de frayères et de nourriceries pour le Merlu et la Sole d'après Abbès, 1991.

- Frayère merlu
- Frayère sole
- Nourricerie merlu

▶▶▶ ◀◀◀ Axe de migration halieutique vers les zones de frayère ou nourricerie, notamment poissons amphihalin


335000
340000
1°30'O
6300000
6295000
43°40'N
Capbreton
N
W
E
S
0
1
2
3 km

CARTE N°2 DES ENJEUX BIOLOGIQUES DE L'AIRE D'ETUDE

Réalisation : CREOCEAN, 2017
d'après les données issues de :
- Ifremer, 2013: Synthèse de cartes de peuplements benthiques (EUNIS) et indice de richesse benthique - Produit numérique "Granulats marins"
- INPN, 2017 : Périmètres de sites de protection ou de conservation
- MNHN/AAMP, 2014 : Projet d'extension du réseau Natura 2000 au large
- Fonctionnalités halieutiques d'après publications de Guérault et al., 1996 et Abbes R., 1991
- Zone de fréquentation principale par les mammifères marins, secteur estimé d'après: SAMM - Pettex et al., 2014 ; Répartition des oiseaux marins et cétacés dans le sud du Golfe de Gascogne - Milon & Castège, 2016
- SHOM, 2017 : isocontours bathymétriques Homonim
Fond de carte : IGN/SHOM. 2017

Le réseau de l'intelligence électrique

creocean
Environnement & océanographie